



Jak postupovat při krvavém poranění pohozenou injekční jehlou



šetrně vyjmout



nechat spontánně krvácet 5 min



nehmoždit, nemačkat, nevysávat



oplachovat pod tekoucí vodou




ošetřit dezinfekcí



vypláchnout ránu




omýt vodou a mýdlem



ránu krýt obvazem




uschovat v pevné schránce




dopřít k lékařskému ošetření



lékaři poskytnout základní informace



ohlásit policii



vyprat v horké vodě 70°C



informovat policii i o nálezu

1. Jihlu či předmět, který způsobil zranění z rány šetrně vyjmout
2. Pokud rána krvácí, nechat spontánně krvácet alespoň 5 minut
3. Ránu nehmoždit, nemačkat, nevysávat
4. Ránu 5-10 minut oplachovat pod tekoucí vodou a omývat mýdlem
5. Poté ránu ošetřit některým z běžných dezinfekčních prostředků: 3% Peroxid vodíku nebo 3% Chloramin, 1-3% Persteril, 70% akjigik, Sterilium, Jodisol
6. Pokud došlo k poranění oka, úst či nosu, vypláchnout ránu fyziologickým roztokem nebo borovou vodou
7. Krví potřísněné okolí rány omýt vodou a mýdlem
8. Ránu krýt obvazem, aby v případě pokračujícího krvácení, nedošlo ke kontaminaci okolí či jiných osob.
9. Injekční jihlu či jiný předmět, který zranění způsobil, uschovat v pevné schránce, aby nemohlo dojít k dalšímu krvavému poranění. V žádném případě neodhazovat do běžného odpadu, neboť musí být zlikvidován ve zvláštním režimu, jako potenciálně nebezpečný infekční materiál.
10. Zraněného dopravit optimálně do 2 hodin, v krajním případě však do 72 hodin k lékařskému ošetření/praktický lékař - chirurg - na poliklinice, lékař na hygienické stanici. Tento zhození, zda byl zachován standardní racionální postup primárního ošetření a uváží, zda poraněného odesle k erudovanému infekčnímu specialistovi k podrobnějšímu vyšetření či event. započítí postexpozici profylaxe.
11. Ošetřujícímu lékaři poskytnout základní informace : datum a hodinu poranění, způsob ošetření rány, místo a mechanismus zranění, činnost, při které k poranění došlo, odhadnout event. hloubku poranění a intenzitu následného krvácení, odevzdat k zajištění předmět, kterým k poranění došlo k jeho bezpečné likvidaci a předložit očkovací průkaz zraněného (TAT, hepatitidy).
12. Událost ohlásit městské policii či policii ČR.
13. Kontaminované šatstvo vyprat v horké vodě 70°C za použití běžného pracího prášku, nebo ve studené vodě za použití dezinfekčního přípravku (Chloramin, Chloran sodný). Dostatečně účinné je i chemické čištění.
14. V současné době je poměrně vysoká pravděpodobnost, že náhodně nalezená injekční jihla může být potenciálně nebezpečná z kontaminace virem hepatitidy či HIV. Je proto z preventivních důvodů nutné informovat policii i o pouhém nálezu těchto předmětů na veřejných prostranstvích, hřištích, parcích, náměstích či v prostorách a prostředcích městské hromadné dopravy. Není žádoucí tyto předměty odstraňovat sami, bez zvláštních ochranných pomůcek a bez možnosti jejich následné odborné likvidace.